

Ueber die  
Einwirkung von Phosphortrichlorid  
auf  
Phenol und Salicylsäure.

---

Inaugural-Dissertation  
zur  
Erlangung der Doctorwürde  
bei der  
hohen philosophischen Fakultät  
der Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen  
von

**William Orren Emery**

4ter Unterrichts-Assistent am chem. Institut d. Universität Bonn,  
aus Worcester, Mass., U. S. A.

---

**Bonn,**  
Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi.  
1888.



Seinem hochverehrten Lehrer  
Herrn Geh. Reg.-Rath  
**Professor Dr. A. Kekulé**

**in innigster Dankbarkeit**

gewidmet

vom

**Verfasser.**




Digitized by the Internet Archive  
in 2026

## Einleitung.

---

Bekanntlich bildet der Phosphor mit organischen Radicalen Verbindungen, die einerseits den der übrigen der Stickstoffgruppe angehörigen Elemente vielfach gleichen, anderseits aber ein eigentümliches Verhalten zeigen, welches wohl auf die grosse Verwandtschaft des Phosphors zu den electronegativen Elementen zurückgeführt werden muss. Nicht nur in ihrem Verhalten, sondern auch in der Zusammensetzung treten bedeutende Unterschiede hervor. Wir kennen Verbindungen des Phosphors mit ein- und mehrwertigen, mit Sauerstoff und Schwefel enthaltenden organischen Radicalen, welche von den Stickstoffverbindungen mannigfaltig abweichen. Dieselben haben schon bald nach ihrer Entdeckung in hohem Grade das Interesse der Chemiker in Anspruch genommen. Durch die Arbeiten von Hofmann, Cahours, Wurtz, Michaelis, Anschütz und anderen ist die Reihe der dargestellten und untersuchten organischen Phosphorverbindungen eine ziemlich grosse geworden. Die aus den Phosphorchloriden derivirenden Verbindungen stellen eine besondere Körperklasse dar, welche von Michaelis<sup>1)</sup> sehr eingehend studirt worden ist. Diesem gelang es zuerst solche Verbindungen darzustellen, die folgende allgemeine Formeln besitzen:




(worin R ein einwertiges Kohlenwasserstoffradical bedeutet).

---


1) Annalen (1876) **181**, 265. Berichte (1880) **13**, 2174.

z. B.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_2$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_4$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_4$ . Erstere können natürlich als Derivate des Phosphortrichlorids, letztere als Derivate des Phosphorpentachlorids aufgefasst werden.

Bekanntlich absorbiert Phosphortrichlorid mit grosser Energie Chlor und geht dabei in Phosphorpentachlorid über. Führt man nun an Stelle eines Chloratoms Aethyl oder Phenyl ein, so addirt sowohl das Phosaethylchlorid  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_2$  wie das Phosphenylchlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$  mit der grössten Leichtigkeit Chlor, indem sie unter beträchtlicher Temperaturerhöhung in das Phosaethyltetrachlorid  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_4$  resp. Phosphenyltetrachlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_4$  übergehen. Der Phosphor ist in den Verbindungen:  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_2$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$ , unmittelbar mit einem Kohlenstoffatom verbunden und doch scheint er keine wesentliche Veränderung in seiner Anziehungskraft gegen Chlor erlitten zu haben. Betrachten wir jetzt den Fall, wo ein Chloratom des Phosphortrichlorids durch eine Aeth- oder Phenoxygruppe vertreten ist, so haben wir Körper folgender allgemeiner Zusammensetzung:




Derartige Verbindungen sind uns schon bekannt, z. B. das Chlorid der aethylphosphorigen Säure  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OPCl}_2$  und das der phenylphosphorigen Säure  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$ . In diesen Chloriden ist der Phosphor mittelst Sauerstoff indirect mit einem Kohlenstoffatom der Aeth- resp. Phenoxygruppe verbunden. Es fragte sich nun, ob der Phosphor in solchen Verbindungen, in Bezug auf seine Anziehungsintensität gegen Chlor ein gleiches Verhalten wie bei dem Phosaethylchlorid  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_2$  resp. beim Phosphenylchlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$  zeigen würde oder nicht. Mit anderen Worten, dürfte man, beim Behandeln der Körper  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OPCl}_2$  und  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$  mit Chlor, die Entstehung von Verbindungen erwarten, welche als Derivate des Phosphorpentachlorids, also von der allgemeinen Zusammensetzung:




aufzufassen wären. Das Verhalten des Chlorids  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OPCl}_2$  gegen Chlor ist zwar noch nicht beobachtet worden, wohl

aber gegen Brom. Nach Menschutkin<sup>1)</sup> wirkt das Brom gemäss der Gleichung:



Dementsprechend müsste Chlor oder Brom auf das Chlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$  eine ähnliche Spaltung ausüben. Ein vorläufiger Versuch hat jedoch gezeigt, dass die Einwirkung von Chlor resp. Brom auf das Chlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$  nicht nach obiger Gleichung, sondern ganz analog der Einwirkung von Chlor auf das Phosaethylchlorid  $\text{C}_2\text{H}_5\text{PCl}_2$  resp. das Phosphenylchlorid  $\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$  verläuft, und zwar unter Erzeugung des gesuchten Körpers  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OPCl}_4$ . Die nähere Erörterung dieses Versuchs ist an der betreffenden Stelle gegeben worden.

Neuerdings haben Anschütz und Evans<sup>2)</sup> gezeigt, dass dem ersten Einwirkungsprodukt von Antimonpentachlorid auf Oxalsäure sehr wahrscheinlich folgende Formel zukommt:



Ist diese Formel richtig, so kann man sich eine neue Vorstellung über den Gang der Einwirkung von Phosphor-pentachlorid auf Substanzen, die Hydroxylgruppen enthalten, machen, wie Anschütz und Evans<sup>3)</sup> auseinander-gesetzt haben. Die erste Phase der Reaction könnte offenbar darin bestehen, dass die Entstehung von Verbindungen stattfindet, welche dem Körper  $(\text{COOSbCl}_4)_2$  entsprechen.

Die Phenole teilen bekanntlich manche Eigenschaften mit den Alkoholen der Fettreihe, stehen jedoch in gewisser Hinsicht auch den eigentlichen Säuren oder Carboxylverbindungen nabe, so dass ihr Verhalten zwischen dem der Alkohole und der Säuren liegt. Ist der Sauerstoff der

1) Ann. Chem. und Pharm. (1866) **139**, 347.

2) Ann. Chem. und Pharm. (1887) **239**, 285.

3) Ann. Chem. und Pharm. (1887) **239**, 285.

Hydroxylgruppe leicht ersetzbar, so findet bei Einwirkung von Phosphorpentachlorid, die Bildung von Phosphoroxychlorid und der Austausch des Hydroxylwasserstoffs gegen Chlor statt. Ist dagegen der Hydroxylsauerstoff schwer eliminirbar, wie in den Phenolen und aromatischen Oxy-säuren, so könnte es gelingen Verbindungen direct oder indirect darzustellen, die gemäss der allgemeinen Formel:  $R.O.PCl_4$ , zusammengesetzt sind. Es wurde vermutet, dass man leichter zu diesen Verbindungen auf indirectem Wege gelangte, als wenn man versuchte die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Phenol so zu leiten, dass nach und nach je nach den Reactionsbedingungen ein, zwei oder drei Chloratome durch Phenoxygruppen ersetzt würden.

In der Hoffnung unsere Kenntnisse dieser bis jetzt wenig bekannten Körper zu erweitern und einige Anhaltspunkte zur Beurteilung oder Bestätigung ihrer Constitution beibringen zu können, habe ich Phosphortrichlorid auf Phenol sowie auf Salicylsäure einwirken lassen, um die Phenoxy-substitutionsproducte des Phosphortrichlorids zunächst zu isoliren und dann mit Chlor zu verbinden.

Demnach zerfällt die vorliegende Arbeit in folgende Abschnitte:

## I. Abschnitt.

1. Ueber die Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Phenol.
  - a) Phenylphosphorigsäuredichlorid.
  - b) Diphenylphosphorigsäuremonochlorid.
  - c) Phosphorigsäuretriphenylester.
2. Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf die Phenol-derivate des Phosphortrichlorids.
3. Einwirkung von Chlor resp. Brom auf die Phenol-derivate des Phosphortrichlorids.

- a) Phenylphosphorsäuretrichlorid.
  - b) Diphenylphosphorsäuretrichlorid.
  - c) Triphenylphosphorsäuredichlorid.
  - d) Phenylphosphorsäuredichloriddibromid.
  - e) Diphenylphosphorsäuremonochloriddibromid.
4. Einwirkung von Schwefel auf die Phenolderivate des Phosphortrichlorids.
- a) Phenylthiophosphorsäuredichlorid.
  - b) Diphenylthiophosphorsäuremonochlorid.
  - c) Thiophosphorsäuretriphenylester.

## II. Abschnitt.

1. Ueber die Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Salicylsäure.
  - a) Salicylphosphorigsäuremonochlorid.
2. Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf das Salicylphosphorigsäuremonochlorid.
3. Einwirkung von Chlor resp. Brom auf das Salicylphosphorigsäuremonochlorid.
4. Ueber die Constitution des Salicylphosphorigsäuremonochlorids, sowie einiger seiner Derivate.
5. Schlussbetrachtungen.

---

## I. Abschnitt.

---

### 1. Ueber die Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Phenol.

In den nachfolgenden Versuchen sind alle Vorsichtsmassregeln in Bezug auf Reinheit der Ausgangsmaterialien und Trockenheit der Apparate streng beobachtet worden.

Behandelt man Phenol mit Phosphortrichlorid, so findet eine energische Reaction statt und es entsteht, wie E. Noack<sup>1)</sup> gezeigt hat, je nach den Mengenverhältnissen der beiden Reagentien, eine der drei folgenden Substanzen als Hauptproduct:

Phenylphosphorigsäuredichlorid:  $\text{C}_6\text{H}_5\text{O PCl}_2$ .

Diphenylphosphorigsäuremonochlorid:  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_2\text{PCl}$ .

Phosphorigsäuretriphenylester:  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_3\text{P}$ .

Die Schwierigkeiten, mit denen Noack bei der Reindarstellung dieser drei Verbindungen zu kämpfen hatte, verschwinden, wenn man die Reactionsproducte von Phosphortrichlorid auf Phenol unter stark vermindertem Druck herausarbeitet.

Da die Siedepunkte dieser Substanzen weit auseinanderliegen, so bietet ihre Trennung durch Fractioniren im Vacuum keinerlei Schwierigkeiten. Um die zwei ersten Glieder dieser Reihe darzustellen, verfährt man, wie mehrere Versuche gelehrt haben, am zweckmässigsten folgendermassen.

Wasserfreies festes Phenol wird mit frischdestillirtem Phosphortrichlorid übergossen, und zwar nach dem Mengenverhältnisse von gleichen Molecülen. Die Reaction wird im Destillirkölbchen am Rückflusskühler vorgenommen, am Ende des Kühlers ein Chlorcalciumrohr angebracht, die entweichenden Gase in einem mit Wasser gefüllten gewogenen Gefäss aufgefangen. Schon in der Kälte ist die Einwirkung äusserst energisch; das feste Phenol löst sich allmählich in dem Phosphortrichlorid auf, unter reichlichem Entweichen von Chlorwasserstoffsäure und beträchtlicher Abkühlung. Nachdem die freiwillige Entwicklung von Salzsäure vorüber ist, wird die Reaction schliesslich zu Ende geführt durch gelindes Erwärmen des Paraffinbades, in welches das Reaktionskölbchen eintaucht. Das Erwärmen


---

1) Ann. Chem. und Pharm. (1883) **218**, 85.

darf  $80^{\circ}$  nicht überschreiten, sonst wird die Einwirkung zu weit geführt; es entstehen dann grössere Mengen des Monochlorids  $(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_2\text{PCl}$  resp. des neutralen Esters  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_3\text{P}$ . In einem Versuch, bei Anwendung von 58.0g Phenol und 85.0g Phosphortrichlorid, hatte das Gefäss, in welchem die entstandene Salzsäure aufgefangen werden sollte, 25.0g zugenommen, während der Theorie nach nur 22.0g HCl sich hätten entwickeln können. Das abnorme Gewicht erklärt sich dadurch, dass das vorgelegte Wasser nicht nur Salzsäure sondern auch etwas Phosphorigsäure enthielt. Die entweichende Chlorwasserstoffsäure hatte also Spuren von Phosphortrichlorid mit sich gerissen. Man muss daher für gute Rückflusskühlung Sorge tragen, wenn man beträchtliche Mengen Phosphortrichlorid mit der Salzsäure in das vorgelegte Gefäss nicht übergehen lassen und die abgespaltete HCl genau nachweisen will.


Nach beendeter Reaction — dieselbe dauert immer 2 bis 4 Stunden — wird die Reaktionsmasse, welche eine farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit bildet, der Destillation unter stark vermindertem Druck unterworfen. Es ist nicht nötig einen trockenen Kohlensäurestrom durch die Reaktionsmasse zu leiten, um etwa vorhandene Mengen Salzsäure zu verjagen. Die Verdrängung letzterer wird durch das Fractioniren im Vacuum gut besorgt. Um zu den befriedigendsten Resultaten zu gelangen, habe ich es ratsam gefunden, das Rectificiren sowohl dieser Substanzen wie auch der folgenden in solchen Kölbchen vorzunehmen, deren Abflussröhre in der Art gebogen ist, wie nebenstehende Figur veranschaulicht.

Bei dem Fractioniren im Vacuum wirkt diese Art Abflussrohr dem Spritzen der Flüssigkeit recht vorteilhaft entgegen. Der obenerwähnte Versuch ergab



etwa 52.0 g analysenreines  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$ , 37.0 g  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_2\text{PCl}$  und 3.0 g  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_3\text{P}$ .

a) Phenylphosphorigsäuredichlorid,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$ , entsteht als Hauptproduct, wenn man Phosphor-  
trichlorid und Phenol in äquimolecularem Mengenverhältniss  
aufeinander einwirken lässt, und zwar nach der Gleichung:



Nach zweimaligem Fractioniren erhält man das Phenylphosphorigsäuredichlorid rein. Es bildet eine wasserhelle, stark  
lichtbrechende, nach Salzsäure riechende Flüssigkeit, die  
sich mit Wasser ungemein leicht in Phenol, Phosphorig-  
säure und Salzsäure zersetzt. In Aether, Chloroform, Tetra-  
chlorkohlenstoff und Ligroin ist es leicht löslich und un-  
ter etwa 11 mm Druck liegt der Siedepunkt bei  $90^\circ$  (Tem-  
peratur des Paraffinbades  $110^\circ$ ).

Die vorliegenden analytischen Resultate sprechen für  
die Reinheit des Chlorids.

1. 0.1599 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lie-  
ferten 0.2163  $\text{CO}_2$  und 0.0402  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.1494 g Substanz lieferten 0.2025  $\text{CO}_2$  und 0.0359  
 $\text{H}_2\text{O}$ .

3. 0.1818 g Substanz mit rauchender Salpetersäure  
auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.2662  $\text{AgCl}$  und 0.1040  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

4. 0.1520 g Substanz ergaben 0.2227  $\text{AgCl}$  und 0.0869  
 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für                       |             | Gefunden |       |       |       |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|
|                                     |             | 1        | 2     | 3     | 4     |
| $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_2$ |             |          |       |       |       |
| C                                   | 36.92       | 36.89    | 36.96 | —     | —     |
| H                                   | 2.56        | 2.79     | 2.67  | —     | —     |
| P                                   | 15.89       | —        | —     | 15.97 | 15.96 |
| Cl                                  | 36.41       | —        | —     | 36.22 | 36.25 |
| O                                   | 8.21        | —        | —     | —     | —     |
|                                     | <hr/> 99.99 |          |       |       |       |

Eine Bestimmung des specifischen Gewichts, mittelst eines Sprengel'schen Pyknometers ausgeführt, ergab den Wert:

$$d \frac{20}{4} = 1.35422.$$

Noack fand für das specifische Gewicht bei 18° den Wert 1.348.

b) Diphenylphosphorigsäuremonochlorid ( $C_6H_5O)_2PCl$ , wird schon als Nebenproduct in nicht unbedeutlichen Mengen bei der Bereitung der vorigen Verbindung erhalten und stellt eine farblose Flüssigkeit von starkem Lichtbrechungsvermögen dar. Es verhält sich sehr ähnlich wie das Phenylphosphorigsäuredichlorid, doch besitzt es einen schwächeren Geruch nach Salzsäure. Das reine Chlorid löst sich leicht in Aether, Ligroin und Schwefelkohlenstoff und siedet constant bei 172° unter etwa 11mm Druck (Temperatur des Paraffinbades 190°).

Das specifische Gewicht beträgt

$$d \frac{20}{4} = 1.24378.$$

Von Noack wurde der Wert zu 1.221 gegen Wasser von 18° gefunden.

Die Analyse ergab folgendes Resultat:

1. 0.1428g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.2997  $CO_2$  und 0.0530  $H_2O$ .

2. 0.1400g Substanz lieferten 0.2934  $CO_2$  und 0.0537  $H_2O$ .

3. 0.1677g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf 270° erhitzt ergaben 0.0943  $AgCl$  und 0.0741  $Mg_2P_2O_7$ .

4. 0.1841g Substanz ergaben 0.1030  $AgCl$  und 0.0799  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet für        |       | Gefunden |       |       |       |
|----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $C_{12}H_{10}O_2PCl$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C                    | 57.03 | 57.25    | 57.15 | —     | —     |
| H                    | 3.96  | 4.12     | 4.26  | —     | —     |
| P                    | 12.28 | —        | —     | 12.34 | 12.12 |
| Cl                   | 14.06 | —        | —     | 13.91 | 13.84 |
| O                    | 12.67 | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>                |       |          |       |       |       |
| 100.00               |       |          |       |       |       |

c) Phosphorigsäuretriphenylester,  $(C_6H_5O)_3P$ , entsteht in kleinen Mengen bei der Darstellung der zwei vorigen Verbindungen, ausschliesslich aber durch Einwirkung von 1 Mol. Phosphortrichlorid auf 3 Mol. Phenol:



Nach dem Aufhören der freiwilligen Salzsäureentwicklung, erwärmt man die Reaktionsmasse bis auf  $150^\circ$ , um die neutrale Esterbildung zu vervollständigen. Alsdann wird der Triphenylester der Destillation unter stark vermindertem Druck unterworfen. Nach zweimaligem Fractioniren erhält man ihn analysenrein. Der Ester bildet eine farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit, die einen schwach an Phenol erinnernden Geruch besitzt. Unter etwa 11mm Druck und Anwendung eines Graphitbades siedet derselbe constant bei  $220^\circ$ . Die Analyse ergab folgendes Resultat:

1. 0.1372g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3497  $CO_2$  und 0.0624  $H_2O$ .

2. 0.1644g Substanz lieferten 0.4186  $CO_2$  und 0.0723  $H_2O$ .

3. 0.1342g Substanz mit rauchender Salpetersäure zwei Stunden auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.0475  $Mg_2P_2O_7$ .

4. 0.1028g Substanz ergaben 0.0364  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet für      |       | Gefunden |       |      |      |
|--------------------|-------|----------|-------|------|------|
| $C_{18}H_{15}O_3P$ |       | 1        | 2     | 3    | 4    |
| C                  | 69.68 | 69.51    | 69.44 | —    | —    |
| H                  | 4.84  | 5.05     | 4.88  | —    | —    |
| P                  | 10.00 | —        | —     | 9.88 | 9.89 |
| O                  | 15.48 | —        | —     | —    | —    |
| <hr/>              |       |          |       |      |      |
| 100.00             |       |          |       |      |      |

Eine spezifische Gewichtsbestimmung ergab den Wert:


$$d \frac{20}{4} = 1.18428.$$

Noack fand den Wert zu 1.184 gegen Wasser von 18°.

In einer Kältemischung von Aether und fester Kohlensäure erstarrte der Phosphorigsäuretriphenylester zu einer durchsichtigen Masse, wurde aber, nachdem er aus der Kältemischung genommen worden war, bald wieder flüssig, ging jedoch allmählich in eine weisse, krystallinische, aus langen Nadeln bestehende Masse über. In diesem Zustand blieb er lange Zeit, wurde aber langsam wieder flüssig.

## 2. Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf die drei Phenoxylderivate des Phosphortrichlorids.

Des theoretischen Interesses halber schien es wünschenswert die Darstellung der Verbindungen:



zu versuchen und zunächst durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf die Substanzen:



Scheinbar findet in der Kälte keine Reaction statt. Wird aber irgend eine der Verbindungen:  $C_6H_5OPCl_2$ ,  $(C_6H_5O)_2PCl$ ,  $(C_6H_5O)_3P$  mit Phosphorpentachlorid in äquimolekularem Mengenverhältniss im zugeschmolzenen Rohr auf  $100^0$  erhitzt, so entsteht, ohne Entwicklung von Salzsäure, ein in Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff lösliches, festes, weisses Reactionsproduct. Sehr interessant ist der Verlauf der Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf das Phenylphosphorigsäuredichlorid  $C_6H_5OPCl_2$ . Zunächst beginnt bei gelindem Erwärmen die allmähliche Verflüssigung des Phosphorpentachlorids, es entstehen Tropfen der neuen geschmolzenen Verbindung, die in Phosphortrichlorid schwimmen, und schliesslich lagern sich zwei Flüssigkeitsschichten übereinander, von denen die eine beim Erkalten erstarrt. Der in der Kälte flüssig bleibende Teil besteht aus reinem Phosphortrichlorid (Siedepunkt  $78^0$ ).

Wenn auch diese scheinbare glatte Bildung von Phosphortrichlorid als ein indirecter Beweis dafür angesehen werden kann, dass die feste Verbindung der gesuchte Körper  $C_6H_5OPCl_4$  ist, so ist diese Verbindung, wegen ihrer ausserordentlich grossen Neigung sich mit Wasser zu zersetzen, doch sehr schwer analysenrein zu gewinnen. Mehrere Chlorbestimmungen ergaben Werte, die der Theorie nach 2 bis 4pct. zu wenig waren.


0.1567 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^0$  erhitzt ergaben 0.3170 AgCl.

| Berechnet auf  | Gefunden |
|----------------|----------|
| $C_6H_5OPCl_4$ |          |
| Cl 53.48       | 50.14    |


Auch bei der Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf die Verbindungen:  $(C_6H_5O)_2PCl$  und  $(C_6H_5O)_3P$ , habe ich in beiden Fällen die Entstehung des Phosphortrichlorids nachgewiesen, jedoch ist es mir nicht gelungen die Additionsproducte auf diese Weise analysenrein zu erhalten.

### 3. Einwirkung von Chlor und Brom auf die Phenoxylderivate des Phosphortrichlorids.

Die Reaction könnte in der Weise verlaufen, dass die drei Verbindungen sich mit Chlor resp. Brom vereinigen, also bei Phenylphosphorigsäuredichlorid  $C_6H_5OPCl_2$  nach der Gleichung:



der Einwirkung von Chlor resp. Brom auf Phosphenylchlorid  $C_6H_5PCl_2$  entsprechend:



Die Erfahrung hat in der That gezeigt, dass die Reaction, genau wie obige Gleichungen andeuten, verläuft. Wegen der ungemein leichten Zersetzbarkeit dieser Additionsproducte hat es eine ziemliche Zeit in Anspruch genommen, ehe die geeignetsten Darstellungsbedingungen aufgefunden werden konnten. Nach vielen vergeblichen Versuchen zur Bereitung der Chlorverbindungen hat mich folgendes Verfahren zum Ziele geführt.

Phenylphosphorigsäuredichlorid wird in absolutem Aether gelöst und, um ein Verstopfen des Einleitungsrohrs zu verhindern, nur auf die Oberfläche dieser Lösung ein mit Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid völlig getrockneter Chlorstrom geleitet. Das Chlor wird sehr begierig und unter beträchtlicher Erwärmung der Lösung absorbirt. Die Bildung eines neuen Körpers beginnt sich sofort bemerklich zu machen durch die Ausscheidung weisser, nadel- oder blattförmiger Krystalle. Es ist ratsam

das Reactionsgefäss in kaltes Wasser einzutauchen. Wenn man nicht für gute Kühlung Sorge trägt, geht die Masse in einen breiförmigen Zustand über, aus welchem das Additionsproduct sich schlecht herausarbeiten lässt. Man setzt das Einleiten von Chlor so lange fort, bis sich die Ausscheidung nicht mehr vermehrt, oder besser bis die Masse eine schwach hellgelbe Farbe annimmt, welche von etwas anhaftendem überschüssigem Chlor herrührt. Hierauf wird die Mutterlauge von den Krystallen abgegossen, dann die letzten Reste der Mutterlauge zweimal mit absolut trockenem Aether weggespült. Da das neue Product ein ungemein hygroscopischer Körper ist, muss das Abwägen zu den Analysen mit der grössten Sorgfalt und möglichst schnell ausgeführt werden. Ich habe folgendermassen gearbeitet.

Man bringt mit einem Platinspatel die zu einer Analyse nötige Menge der Krystalle rasch in ein vorher gewogenes Fläschchen. In einem mit Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid beschickten Vacuumexsiccator befreit man das Additionsproduct von Aether durch halbstündiges Aussaugen, schliesst nun das Wägefläschchen sofort mit dem zugehörigen Glasstopfen und wägt. Die Analysen ergaben folgende Werte:

1. 0.1803g Substanz mit Bleichromat im geschlossenen Rohr verbrannt lieferten 0.1824  $\text{CO}_2$  und 0.0363  $\text{H}_2\text{O}$ .
2. 0.2559g Substanz lieferten 0.2604  $\text{CO}_2$  und 0.0454  $\text{H}_2\text{O}$ .
3. 0.1448g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt, ergaben 0.3078  $\text{AgCl}$  und 0.0605  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .
4. 0.1848g Substanz ergaben 0.3920  $\text{AgCl}$  und 0.0774  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für  |       | Gefunden |       |       |       |
|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $C_6H_5OPCl_4$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C              | 27.07 | 27.59    | 27.75 | —     | —     |
| H              | 1.88  | 2.24     | 1.97  | —     | —     |
| P              | 11.65 | —        | —     | 11.67 | 11.71 |
| Cl             | 53.38 | —        | —     | 52.59 | 52.53 |
| O              | 6.11  | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>          |       |          |       |       |       |
| 99.99          |       |          |       |       |       |

Obgleich die Analysen dieser neuen Verbindung, wegen der ausserordentlich grossen Neigung der letzteren sich mit Wasser zu zersetzen, sehr schwer ausführbar sind, lassen die Resultate der Elementaranalyse keinen Zweifel darüber, dass die analysirte Substanz die gesuchte Verbindung ist und ihr mithin die Zusammensetzung  $C_6H_5OPCl_4$  zukommt.

a) Phenylphosphorsäuretetrachlorid,  $C_6H_5OPCl_4$ , stellt weisse, krystallinische Nadelchen oder Blättchen dar, die in Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff löslich, in Aether und Petroläther unlöslich sind. In Berührung mit der Luft zerfliesst es sofort, unter starkem Rauchen und Abgabe von Salzsäure, zu einer öligen Masse, welche beim Abkühlen nicht wieder zum Erstarren zu bringen ist. Beim Versetzen des Tetrachlorids mit Wasser findet ein starkes Zischen und eine beträchtliche Temperaturerhöhung unter Abgabe von Salzsäure statt. In der wässrigen Lösung lässt sich Phosphorsäure in reichlichen Mengen nachweisen. Das Zersetzungsproduct besteht aus einem gelbgefärbten Oel, welches specifisch schwerer wie das Wasser selber ist. Hierauf wurde mit Aether extrahirt, die ätherische Lösung mit Wasser gewaschen, über Chlorcalcium getrocknet und nun im Vacuum rectificirt. Nachdem der Aether verjagt war, stieg die Temperatur bis auf  $245^\circ$ , bei welcher, unter etwa 11 mm Druck, fast ein Fünftel des Ganzen überging. Das Destillat erstarrte bald zu einer kaum ge-

färbten, krystallinischen Masse. Der verharzte Rückstand war verhältnissmässig gross. Eine vorläufige Elementaranalyse des Destillats zeigte, dass unreines Triphenylphosphorsäureester,  $(C_6H_5O)_3PO$  vorlag, indem der Kohlenstoffgehalt etwa 2 pct. zu niedrig war. Das Product wurde daher aus Alkohol umkrystallisirt und bildete dann weisse Nadelchen vom Schmelzpunkt  $44-45^\circ$ . Die Analyse ergab folgende Zahlenwerte:

1. 0.1538 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3700  $CO_2$  und 0.0673  $H_2O$ ,

2. 0.1279 g Substanz ergaben 0.0424  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet auf      |       | Gefunden |      |
|--------------------|-------|----------|------|
| $C_{18}H_{15}O_4P$ |       | 1        | 2    |
| C                  | 66.26 | 65.61    | —    |
| H                  | 4.60  | 4.84     | —    |
| P                  | 9.51  | —        | 9.26 |
| O                  | 19.63 | —        | —    |
| <hr/>              |       |          |      |
| 100.00             |       |          |      |

Obgleich der Kohlenstoffgehalt immer noch etwas zu niedrig bleibt, kann wohl doch kein Zweifel daran aufkommen, dass die analysirte Substanz die Zusammensetzung  $(C_6H_5O)_3PO$  besitzt.

Auch gegen Wärme ist das Phenylphosphorsäuretetra-  
chlorid äusserst unbeständig, es war mithin interessant  
sein Verhalten beim Erhitzen für sich kennen zu lernen.  
Michaelis<sup>1)</sup> hat gezeigt, dass das Phosphenyltetra-  
chlorid beim Erhitzen für sich in Chlorbenzol und Phosphortri-  
chlorid zerfällt und zwar nach der Gleichung:



Dementsprechend könnte das Phenylphosphorsäure-  
tetra-  
chlorid in Chlorbenzol und Phosphoroxychlorid zerfallen:



Etwa 10 g des Tetrachlorids wurden in einem Destil-


---

1) Ann. Chem. und Pharm. (1876), **181**, 296.


lirkölbchen am Rückflusskühler allmählich erwärmt, bis das Paraffinbad, in welches das Reactionsgefäss eintauchte, 130° erreicht hat. Bei dieser Temperatur begann sich eine Salzsäureentwicklung bemerklich zu machen. Hieraus ergab es sich, dass die  $\text{PCl}_4$ -gruppe wenigstens bis zu einem gewissen Grade chlorirend auf die Phenoxygruppe einwirkte. Das Bad wurde nun einige Sekunden bis auf 160° erhitzt. Nach dem Erkalten bestand die Reactionsmasse aus einer gelbgefärbten Flüssigkeit, welche bei der fractionirten Destillation einen bei 90—120°, einen bei 120—165° und einen bis 215° siedenden Teil ergab. Ersterer rauchte stark an der Luft, zersetzte sich mit Wasser unter Bildung von Salzsäure und Phosphorsäure und war mithin grösstenteils Phosphoroxychlorid. Der zweite Teil wurde mit Wasser versetzt, mit Aether ausgezogen, über Chlorealcium getrocknet und hierauf rectificirt. Die Flüssigkeit zeigte zwar keinen constanten Siedepunkt, ergab aber ein Paar Tropfen eines bei 130—132° siedenden Teils; sehr wahrscheinlich Monochlorbenzol. Auf eine Analyse desselben habe ich verzichten müssen, da die Menge zu gering war.

Der letzte höher siedende Teil wurde stets in vorwiegender Menge erhalten; er besass keinen constanten Siedepunkt, zeigte jedoch die Eigenschaften eines Gemisches höher gechlorter Benzole. Die Zersetzung des Tetrachlorids war demnach keine einfache.

Michaelis<sup>1)</sup> hat ferner gezeigt, dass das Phosphenyltetrachlorid, mit Schwefligsäure behandelt, ganz glatt Phosphenyloxychlorid und Thionylchlorid liefert:



Dementsprechend müsste Phenylphosphorsäuretetra-chlorid, mit Schwefligsäure, Phenylphosphorsäuredichlorid und Thionylchlorid geben:



1) Ann. Chem. und Pharm. (1876), **181**, 297.

Leitet man Schwefligsäure zu Phenylphosphorsäure-tetrachlorid  $C_6H_5OPCl_4$ , so zerfließt dieses unter starker Wärmeentwicklung zu einer hellgelb gefärbten Flüssigkeit, welche bei der Destillation einen bei  $78^\circ$  und einen leidlich constant bei  $121-122^\circ$  unter etwa 11 mm Druck siedenden Teil ergab. Ersterer bewies sich als Thionylchlorid  $SOCl_2$ . Eine Chlorbestimmung des letzteren ergab folgendes Resultat:

0.1264 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt lieferten 0.1728 AgCl.

| Berechnet für    | Gefunden |
|------------------|----------|
| $C_6H_5O_2PCl_2$ |          |
| C 33.65          | 33.79.   |

Demnach war die Reaction im angedeuteten Sinne verlaufen. Aus dem vorhergehenden wird es leicht ersichtlich, dass das Phenylphosphorsäure-tetrachlorid  $C_6H_5OPCl_4$ , ähnlich dem Phosphorpentachlorid, in gewissen Fällen chlorirend einzuwirken vermag.

b) Diphenylphosphorsäuretrichlorid,  $(C_6H_5O)_2PCl_3$ . Zur Darstellung dieser Verbindung wurden etwa 5 g  $(C_6H_5O)_2PCl$  in 10—15 ccm absolutem Aether gelöst, und auf die Oberfläche dieser Lösung trockenes Chlor geleitet. In dem Masse als sich das Chloradditionsproduct unter beträchtlicher Temperaturerhöhung bildete, schied es sich als gelbliches Oel ab, welches nach und nach zu einer krystallinischen Masse erstarrte. Man entfernt die Mutterlauge von den Krystallen, spült zwei- bis dreimal letztere mit ganz trockenem Aether aus und nun wird die Substanz analysirt. Die Elementaranalyse führte zu der Formel  $(C_6H_5O)_2PCl_3$ .

1. 0.1240 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.1984  $CO_2$  und 0.0352  $H_2O$ .

2. 0.1499 g Substanz lieferten 0.2394  $CO_2$  und 0.0451  $H_2O$ .

3. 0.2548 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^{\circ}$  erhitzt ergaben 0.3570 AgCl und 0.0834  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

4. 0.2064 g Substanz ergaben 0.2887 AgCl und 0.0679  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet auf                                      |       | Gefunden |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{PCl}_3$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C                                                  | 44.51 | 43.63    | 43.56 | —     | —     |
| H                                                  | 3.09  | 3.15     | 3.34  | —     | —     |
| P                                                  | 9.59  | —        | —     | 9.14  | 9.18  |
| Cl                                                 | 32.92 | —        | —     | 34.66 | 34.60 |
| O                                                  | 9.89  | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>                                              |       |          |       |       |       |
| 100.00                                             |       |          |       |       |       |

Der von der Theorie abweichende Gehalt an Kohlenstoff und Chlor ist zwar nicht unbedeutend, kann jedoch seine Erklärung darin finden, dass eine geringe Chlorirung des Benzolkerns eingetreten sei. Da die Zahlen leidlich unter einander stimmen, so lassen die Resultate der Analyse keinen Zweifel darüber, dass die Zusammensetzung der Formel  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_2\text{PCl}_3$  entspricht. Das Trichlorid ist löslich in Chloroform, unlöslich in Aether. Gegen Wärme ist es sehr unbeständig, z. B. bei der Darstellung bleibt die Masse bisweilen, auch nach dem Ausspülen mit Aether, lange Zeit breiförmig, namentlich wenn man nicht gut gekühlt hat. Beim Eintragen des Trichlorids in Wasser findet unter starkem Zischen eine heftige Zersetzung statt. Das Zersetzungsproduct schwimmt im Wasser als kaum gefärbtes Oel. Ausserdem enthält die wässrige Lösung reichliche Mengen Salzsäure und Phosphorsäure. Hierauf wurde mit Aether extrahirt, mehrmals mit Wasser gewaschen, über Chlorcalcium getrocknet und nun der Aether im Vacuum verdunstet. Unter etwa 11 mm Druck destillirte ein Teil constant bei  $245^{\circ}$  (unter Anwendung eines Graphitbades).

Das Destillat erstarrte bald zu einer farblosen krystal-

linischen Masse, welche aus Alkohol umkrystallirt feine farblose Nadeln darstellte. Letztere zeigten den Schmelzpunkt 44—45°. Die Elementaranalyse ergab folgende Zahlenwerte:

1. 0.1633 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3951 CO<sub>2</sub> und 0.0704 H<sub>2</sub>O.

2. 0.1467 g Substanz lieferten 0.0502 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

| Berechnet für                                    | Gefunden |      |
|--------------------------------------------------|----------|------|
| C <sub>18</sub> H <sub>15</sub> O <sub>4</sub> P | 1        | 2    |
| C 66.26                                          | 65.98    | —    |
| H 4.60                                           | 4.79     | —    |
| P 9.51                                           | —        | 9.56 |
| O 19.63                                          | —        | —    |
| <hr/> 100.00                                     |          |      |

Demnach war die Reaction ähnlich verlaufen wie beim Phenylphosphorsäuretetrachlorid. Die Entstehung des neutralen Esters in beiden Fällen schien auf den ersten Blick auffallend zu sein. Hier könnte ein ähnlicher Vorgang stattgefunden haben, wie ihn gewisse anorganische Phosphorsäuresalze zeigen. Die sauren phosphorsauren Salze des Silbers sowie des Mangans zerfallen bekanntlich in wässriger Lösung langsam in der Kälte, schneller aber in der Wärme in Phosphorsäure und die neutralen Salze.

c) Triphenylphosphorsäuredichlorid, (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>3</sub>PCl<sub>2</sub>, wird auf analoge Weise, wie die zwei vorigen Verbindungen bereitet. Die neue Substanz scheidet sich aus der ätherischen Lösung von (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>3</sub>P zuerst milchig ab, dann sammeln sich allmählich am Boden des Reactionsgefäßes gelbliche ölige Tropfen, die nach dem Ausspülen mit trockenem Aether von selbst nicht erstarren. Um eine Analyse dieser Substanz ausführen zu können, musste das Product mittelst Aether und fester Kohlensäure

zum Erstarren gebracht werden. Hierauf wurde die zur Analyse nötige Menge mit einem Platinspatel schnell in ein vorher gewogenes Fläschchen gebracht. Nach dem Verjagen des vorhandenen Aethers in einem Vacuumexsiccator wurde das Fläschchen gewogen. Die Analyse ergab Folgendes:

1. 0.0865 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.1777  $\text{CO}_2$  und 0.0342  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.0726 g Substanz lieferten 0.1497  $\text{CO}_2$  und 0.0276  $\text{H}_2\text{O}$ .

3. 0.1148 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.0888  $\text{AgCl}$ .

4. 0.1050 g Substanz ergaben 0.0779  $\text{AgCl}$  und 0.0290  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für                                      |       | Gefunden |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{PCl}_2$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C                                                  | 56.69 | 56.03    | 56.23 | —     | —     |
| H                                                  | 3.94  | 4.39     | 4.21  | —     | —     |
| Cl                                                 | 18.63 | —        | —     | 19.13 | 18.36 |
| P                                                  | 8.14  | —        | —     | —     | 7.71  |
| O                                                  | 12.59 | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>                                              |       |          |       |       |       |
| 99.99                                              |       |          |       |       |       |

Das Triphenylphosphorsäuredichlorid  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_3\text{PCl}_2$  verhält sich im Allgemeinen den zwei vorhergehenden Additionsproducten ganz analog. Mit Wasser setzt es sich unter Bildung von Salzsäure und Phosphorsäuretriphenylester lebhaft um. Letzterer durch Destillation und Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt, schmolz bei  $44-45^\circ$  und ergab bei der Analyse Folgendes:

1. 0.1325 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3200  $\text{CO}_2$  und 0.0585  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.1329 g Substanz ergaben 0.0441  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet auf      |       | Gefunden |      |
|--------------------|-------|----------|------|
| $C_{18}H_{15}O_4P$ |       | 1        | 2    |
| C                  | 66.26 | 65.87    | —    |
| H                  | 4.60  | 4.90     | —    |
| P                  | 9.51  | —        | 9.27 |
| O                  | 19.63 | —        | —    |
| <hr/>              |       |          |      |
| 100.40             |       |          |      |

d) Phenylphosphorsäuredichloriddibromid,  $C_6H_5OPCl_2Br_2$ . Es ist bekannt, dass das Phosphortrichlorid sich nur sehr langsam und schwierig mit Brom zu dem Körper  $PCl_3Br_2$  vereinigt. Ersetzt man dagegen ein Chloratom des Phosphortrichlorids durch eine Phenyl- resp. Phenoxygruppe, so ist die Verbindungsfähigkeit des Phosphors mit Brom eine bedeutend grössere geworden.

Lässt man, unter gutem Abkühlen, ein Molekül durch Schwefelsäure getrocknetes Brom in der Weise auf die äquivalente Menge des Phenylphosphorigsäuredichlorids  $C_6H_5OPCl_2$  einwirken, dass man das erstere beim Verdunsten im Kohlensäurestrom in Dampfform auf die Oberfläche der ätherischen Lösung des Chlorids leitet, so scheidet sich die neue Substanz, ohne irgend eine Gasentwicklung, zuerst als rotgelb gefärbte, ölige Tropfen ab, welche bald zu einer gelben krystallinischen Masse erstarren. Die Reaction verläuft quantitativ, indem alles Brom verbraucht wird. Hierauf giesst man die Mutterlauge von den Krystallen ab, wäscht letztere zweimal mit absolutem Aether und analysirt sofort.

1. 0.3225g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.2301  $CO_2$  und 0.0434  $H_2O$ .


2. 0.0522g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.0982  $AgCl + AgBr$ .

3. 0.1139g Substanz ergaben 0.2124  $AgCl + AgBr$  und 0.0341  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet auf      |       | Gefunden |       |       |
|--------------------|-------|----------|-------|-------|
| $C_6H_5OPCl_2Br_2$ |       | 1        | 2     | 3     |
| C                  | 20.28 | 19.46    | —     | —     |
| H                  | 1.41  | 1.49     | —     | —     |
| Cl + Br            | 65.07 | —        | 65.54 | 64.97 |
| P                  | 8.73  | —        | —     | 8.36  |
| O                  | 4.51  | —        | —     | —     |
| <hr/>              |       |          |       |       |
| 100.00             |       |          |       |       |

Das Bromadditionsproduct zersetzt sich ungemein leicht mit Wasser und ist äusserst unbeständig gegen Wärme, ferner kann es nicht lange Zeit aufbewahrt werden. Es schmilzt zu einer rötlichen Flüssigkeit, die beim Abkühlen nicht wieder zum Erstarren zu bringen ist. In absolutem Aether scheint es sehr schwer löslich zu sein.

e) Diphenylphosphorsäuremonochloriddibromid,  $(C_6H_5O)_2PClBr_2$ , wird auf analoge Weise wie die vorige Verbindung bereitet und zwar entsteht es offenbar nach der Gleichung:



Von der ätherischen Lösung des Chlorids  $(C_6H_5O)_2PCl$  scheidet sich das neue Product zunächst als milchige Flüssigkeit ab, dann als kleine ölige Tropfen, welche bald zu einer orangegelb gefärbten Masse krystallinisch erstarren. Die Analyse ergab auf die Formel  $(C_6H_5O)_2PClBr_2$  stimmende Werte.

1. 0.2397 g Substanz mit Bleichromat verbrannt gaben 0.2996  $CO_2$  und 0.0538  $H_2O$ .

2. 0.0944 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.1176  $AgCl + AgBr$  und 0.0244  $Mg_2P_2O_7$ .

3. 0.0786 g Substanz ergaben 0.0983  $AgCl + AgBr$ .

| Berechnet auf            |       | Gefunden |       |       |
|--------------------------|-------|----------|-------|-------|
| $C_{12}H_{10}O_2PClBr_2$ |       | 1        | 2     | 3     |
| C                        | 34.91 | 34.09    | —     | —     |
| H                        | 2.42  | 2.50     | —     | —     |
| Cl + Br                  | 47.39 | —        | 46.88 | 47.06 |
| P                        | 7.51  | —        | —     | 7.22  |
| O                        | 7.76  | —        | —     | —     |
| <hr/>                    |       |          |       |       |
| 99.99                    |       |          |       |       |


Das Diphenylphosphorsäuremonochloriddibromid ist in seinem Verhalten dem Phenylphosphorsäuredichloriddibromid ganz analog. Es ist leicht löslich in Chloroform, sehr schwer löslich in absolutem Aether, bildet orangegelbe Kryställchen, welche sich beim Schmelzen oder Aufbewahren zersetzen.

#### 4. Einwirkung von Schwefel auf die Phenoxylderivate des Phosphortrichlorids.

Bekanntlich geht der Schwefel in der Kälte mit Phosphortrichlorid keine Verbindung ein, erst bei  $130^{\circ}$  im geschlossenen Rohr findet eine Vereinigung statt. Im Vorhergehenden ist gezeigt worden, dass die Phenoxylderivate des Phosphortrichlorids mit der grössten Leichtigkeit und Energie Chlor resp. Brom absorbiren, und dabei in Derivate des Phosphorpentachlorids übergehen. Ersetzt man nun ein, zwei oder drei Chloratome des Phosphortrichlorids durch Phenoxygruppen, so hat die Additionsfähigkeit des Phosphors dem Schwefel gegenüber abgenommen.

a) Phenylthiophosphorsäuredichlorid,  $C_6H_5OPSCl_2$ . wird in der Weise bereitet, dass man Phenylphosphorigsäuredichlorid mit Schwefelblumen in äquimolecularem Mengenverhältniss zusammenschmilzt. Nachdem das Bad, in welches das Reactionsgefäss eintauchte, eine Temperatur von  $120^{\circ}$ , etwas über dem Schmelzpunkt des Schwefels,

erreicht hat, wurde es erkalten lassen. Der Schwefel, welcher sich in dem Chlorid gelöst hatte, krystallisirte unverändert aus. Dieses Erhitzen und Erkalten wurde nun so lange fort gesetzt und zwar mit immer steigender Temperatur, bis kein Schwefel sich nach dem Erkalten mehr ausschied. Der Versuch hat nun Folgendes ergeben: der Schwefel fängt erst bei  $160^{\circ}$  an mit dem Phenylphosphorigsäuredichlorid eine Verbindung einzugehen; die Vereinigung ist jedoch erst gegen  $190^{\circ}$  vollständig. Die Reaction vollzieht sich offenbar nach der Gleichung:



Das Reactionsproduct bestand aus einer hellgelb gefärbten Flüssigkeit, die nach Salzsäure roch. Zur Reinigung wurde es der fractionirten Destillation im Vacuum unterworfen. Unter etwa 11 mm Druck ging fast das Ganze constant bei  $119\text{--}120^{\circ}$  über (Temperatur des Paraffinbades  $140^{\circ}$ ). Die Elementaranalyse der auf diese Weise erhaltenen Verbindung ergab folgende Zahlenwerte:

1. 0.2883 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3385  $\text{CO}_2$  und 0.0615  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.2459 g Substanz lieferten 0.2892  $\text{CO}_2$  und 0.0524  $\text{H}_2\text{O}$ .

3. 0.1584 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^{\circ}$  erhitzt ergaben 0.2012  $\text{AgCl}$  und 0.1597  $\text{BaSO}_4$ .


4. 0.1694 g Substanz ergaben 0.0821  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für                        |       | Gefunden |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPSCl}_2$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C                                    | 31.71 | 32.01    | 32.07 | —     | —     |
| H                                    | 2.20  | 2.37     | 2.37  | —     | —     |
| Cl                                   | 31.28 | —        | —     | 31.42 | —     |
| S                                    | 14.09 | —        | —     | 13.85 | —     |
| P                                    | 13.65 | —        | —     | —     | 13.54 |
| O                                    | 7.05  | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>                                |       |          |       |       |       |
| 99.98                                |       |          |       |       |       |

Die leidlich mit der Theorie stimmenden Zahlen beweisen, dass die neue Substanz der Formel  $C_6H_5OPSCl_2$  entspricht. Das Phenylthiophosphorsäuredichlorid bildet eine farblose Flüssigkeit von starkem Lichtbrechungsvermögen, riecht nach Salzsäure, ist leicht löslich in Alkohol, Aether und Chloroform. Das specifische Gewicht beträgt:

$$d \frac{20}{4} = 1.40593.$$

Um möglicherweise zu derselben Verbindung direct zu gelangen, liess ich Phosphorsulfochlorid auf Phenol einwirken, und zwar im Verhältniss sowohl gleicher Molecüle wie auch von 1 Mol. Phenol mit 1.5 Mol. Phosphorsulfochlorid. Unter den Versuchsbedingungen durfte man die Entstehung der Verbindungen  $C_6H_5OPSCl_2$  und  $(C_6H_5O)_2PSCl$  erwarten, gemäss folgenden Gleichungen:



analog der Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Phenol:



In beiden Versuchen habe ich keine Spur der gesuchten Verbindungen:  $C_6H_5OPSCl_2$ ,  $(C_6H_5O)_2PSCl$ , in der Reactionsmasse nachweisen können; es entstand ausschliesslich der neutrale Ester der Thiophosphorsäure  $(C_6H_5O)_3PS$ .

Hieraus schliesse ich, dass das Dichlorid  $C_6H_5OPSCl_2$  sowie das Monochlorid  $(C_6H_5O)_2PSCl$  eine grössere Neigung haben, sich mit zwei resp. einem Molecül Phenol umzusetzen, wie das Phosphorsulfochlorid selber, und zwar nach den Gleichungen:



Jedenfalls scheinen das Phosphorsulfochlorid  $PSCl_3$  und der neutrale Ester  $(C_6H_5O)_3PS$  die stabilen Verbindungen zu sein, in welche die intermediären,  $C_6H_5OPSCl_2$  und  $(C_6H_5O)_2PSCl$ , überzugehen streben.

b) Diphenylthiophosphorsäuremonochlorid,  $(C_6H_5O)_2PSCl$ . Die Darstellungsmethode dieser Verbindung ist der des Dichlorids  $C_6H_5OPSCl_2$  ganz ähnlich. Das Diphenylphosphorigsäuremonochlorid  $(C_6H_5O)_2POCl$  wird mit Schwefelblumen kurze Zeit auf  $190^\circ$  erhitzt. Das Reactionsproduct besteht aus einer kaum gefärbten, krystallinischen Masse, die eine dem Phenol ganz ähnliche Structur besitzt. Um das neue Product völlig rein zu gewinnen, wurde es im Vacuum rectificirt. Unter etwa 11mm Druck destillirte eine farblose Flüssigkeit constant bei  $194^\circ$  über, welche bald zu einer weissen krystallinischen Masse erstarrte. Das so erhaltene Product ergab bei der Analyse folgende Zahlenwerte:

1. 0.1889 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.3493 g  $CO_2$  und 0.0649  $H_2O$ .

2. 0.1869 g Substanz lieferten 0.3477  $CO_2$  und 0.0651  $H_2O$ .

3. 0.1761 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt ergaben 0.0892  $AgCl$  und 0.1472  $BaSO_4$ .

4. 0.1503 g Substanz ergaben 0.0595  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet für         |       | Gefunden |       |       |       |
|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| $C_{12}H_{10}O_2PSCl$ |       | 1        | 2     | 3     | 4     |
| C                     | 50.62 | 50.43    | 50.73 | —     | —     |
| H                     | 3.51  | 3.82     | 3.87  | —     | —     |
| Cl                    | 12.48 | —        | —     | 12.52 | —     |
| S                     | 11.25 | —        | —     | 11.48 | —     |
| P                     | 10.89 | —        | —     | —     | 11.05 |
| O                     | 11.25 | —        | —     | —     | —     |
| <hr/>                 |       |          |       |       |       |
| 100.00                |       |          |       |       |       |

Das Diphenylthiophosphorsäuremonochlorid bildet farblose Nadeln vom Schmelzpunkt  $63-64^\circ$ .

c) Thiophosphorsäuretriphenylester,  $(C_6H_5O)_3PS$ , ist zuerst von Schwarze<sup>1)</sup> dargestellt wor-

1) Ann. Chem. und Pharm. (1863), **127**, 157.

den und zwar durch Einwirkung von Phosphorsulfochlorid auf Phenol. Diesen Versuch habe ich wiederholt und kann seine Angaben bestätigen. Analog der Bereitung der zwei vorhergehenden Verbindungen, wurde der Phosphorigsäuretriphenylester mit Schwefelblumen, in äquimolekularem Mengenverhältniss, kurze Zeit auf  $190^{\circ}$  erhitzt. Nach dem Erkalten besass das noch flüssige Reactionsproduct, welches schwach gelb gefärbt war, einen höchst knoblauchartigen Geruch. Um es möglichst zu reinigen, wurde es im Vacuum rectificirt. Unter etwa 11mm Druck und Anwendung eines Graphitbades destillirte der grösste Teil constant bei  $245^{\circ}$ . Der Siedepunkt dieser Verbindung im Vacuum ist also identisch mit dem des Phosphorsäuretriphenylesters  $(C_6H_5O)_3PO$  (Sdp.  $245^{\circ}$  unter etwa 11mm Druck).

Die Analyse ergab Folgendes:

1. 0.1745g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.4050  $CO_2$  und 0.0748  $H_2O$ .

2. 0.1875g Substanz lieferten 0.4356  $CO_2$  und 0.0789  $H_2O$ .

3. 0.1517g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^{\circ}$  erhitzt ergaben 0.1040  $BaSO_4$ .

4. 0.1978g Substanz ergaben 0.0637  $Mg_2P_2O_7$ .

| Berechnet für       | Gefunden |       |      |      |
|---------------------|----------|-------|------|------|
| $C_{18}H_{15}O_3PS$ | 1        | 2     | 3    | 4    |
| C 63.16             | 63.29    | 63.36 | —    | —    |
| H 4.39              | 4.76     | 4.68  | —    | —    |
| P 9.36              | —        | —     | 9.41 | —    |
| S 9.06              | —        | —     | —    | 8.99 |
| O 14.03             | —        | —     | —    | —    |
| <hr/> 100.00        |          |       |      |      |

Das specifische Gewicht des im Zustande der Ueberschmelzung befindlichen Aethers habe ich mit Hülfe eines Sprengel'schen Pyknometers ermittelt.

Der Wert beträgt

$$d \frac{20}{4} = 1.23411.$$

Eine Probe der Substanz aus Alkohol umkrystallisirt zeigte den Schmelzpunkt 49—50°. Der Schmelzpunkt wurde von Schwarze zu 49° gefunden.

## II. Abschnitt.

### 1. Ueber die Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Salicylsäure.

Im vorhergehenden Abschnitte ist gezeigt worden, in welcher Art das Phosphortrichlorid auf Phenol einwirkt, ferner wie die dabei entstandenen Phenoxylsubstitutionsproducte des Phosphortrichlorids sich gegen Chlor, Brom und Schwefel verhalten.

Dieser Abschnitt meiner Arbeit wurde sogar bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen, ehe ich mich mit der Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Phenol zu beschäftigen anfang. Allein da das Phenol naturgemäss viel einfachere Reaktionsverhältnisse zeigt wie eine Phenolcarbonsäure, so habe ich die über das erstere gesammelten Erfahrungen zunächst zusammengestellt.

Das Verhalten der Salicylsäure gegen Phosphortrichlorid war anderseits von besonderem Interesse, weil die Arbeiten von Anschütz und Moore<sup>1)</sup> bis zu einem gewissen Grade die Reaktionsverhältnisse von Phosphorpentachlorid auf Salicylsäure klargelegt hatten. Durch Phosphorpen-

1) Ann. Chem. und Pharm. (1885) 228, 308. 239, 314.

chlorid wird sowohl das Phenol- als das Carboxylhydroxyl angegriffen, wie Phosphortrichlorid auf Salicylsäure einwirken werde, liess sich nicht mit Sicherheit voraussagen. In der That entsteht unter diesen Reactionsverhältnissen ein sehr merkwürdiger Körper, dessen Bildung im Nachfolgenden genauer abgehandelt werden soll.

Mehrere vorläufige Versuche hatten gezeigt, dass Phosphortrichlorid und Salicylsäure aufeinander reagiren, dass zwar das erste Reactionsproduct durch Einwirkung von äquimolecularen Mengen der beiden Substanzen isolirt werden kann, dass jedoch die Ausbeute an demselben wesentlich gesteigert wird, wenn man einen Ueberschuss von Phosphortrichlorid anwendet. In der Kälte reagiren Phosphortrichlorid und Salicylsäure gar nicht aufeinander, erst wenn die Temperatur des Paraffinbades, in welches das Reactionsgefäss eintaucht,  $70^{\circ}$  erreicht hat, beginnt eine lebhafte Salzsäureentwicklung, die bei  $85-90^{\circ}$  schliesslich aufhört. Auf ein Molecül Salicylsäure werden zwei Molecüle Salzsäure abgegeben.

Ich gehe jetzt zu einer genaueren Beschreibung der Darstellungsmethode über.

24 g reine Salicylsäure, die durch mehrtägiges Verweilen über Schwefelsäure vollständig trocken waren, wurden mit 50 g frisch destillirtem Phosphortrichlorid übergossen. Die Reaction wurde im Fractionskölbchen am Rückflusskühler ausgeführt; am oberen Ende des Kühlers befand sich ein Chlorecalciumrohr; die entweichenden Gase wurden in einem mit Wasser gefüllten Gefäss aufgefangen. Das Reactionskölbchen sowie ein Thermometer tauchten in ein Paraffinbad ein, um die Temperatur, bei der die Einwirkung stattfinden würde, festzustellen. Das Bad wurde nun langsam bis auf  $70^{\circ}$  erwärmt, bei welcher Temperatur, eine anfangs schwache, bald aber, als das Phosphortrichlorid mehr in Berührung mit der Salicylsäure kam, lebhafte Salzsäureentwicklung wahrzunehmen war. Die Einwir-

kung war zwar keine heftige, trotzdem fand ein reichliches Entweichen von Salzsäure statt, welches durch vorsichtiges Erhitzen leicht regulirt werden konnte. Nach zwei Stunden war der Kölbcheninhalt verflüssigt, das Bad wurde dann weiter bis auf  $85^{\circ}$  erwärmt und bei dieser Temperatur constant gehalten, bis die Gasentwicklung schliesslich aufhörte. Ueber  $90^{\circ}$  darf die Temperatur nicht steigen, da in jenem Falle nicht destillirbare Nebenproducte entstehen, welche, beim Behandeln mit Wasser oder Natronlauge, Salicylsäure und Phosphorsäure ergeben. In diesem Versuch hatten sich 13.5g HCl entwickelt, während der Theorie nach nur 12.6g HCl sich hätten entwickeln können. Nach beendeter Reaction — dieselbe dauert immer 2—4 Stunden, je nach den angewandten Mengen — wurde die Reactionsmasse, welche aus einer nahezu farblosen Flüssigkeit bestand, der fractionirten Destillation unterworfen. Nachdem das überschüssige Phosphortrichlorid unter gewöhnlichem Druck abdestillirt war, ging das übrige im Vacuum vollständig unzersetzt über und erstarrte in der gut gekühlten Vorlage zu prachtvollen, durchsichtigen Kry stallen. Der Siedepunkt der neuen Verbindung, die nach einmaligem Rectificiren analysenrein erhalten wird, liegt unter etwa 11mm Druck bei  $127^{\circ}$  (Temperatur des Paraffinbades  $150^{\circ}$ ). Die zwei ersten Verbrennungen wurden von einer Fraction ausgeführt, welche in der Kälte noch flüssig war; dieselbe war durch etwa vorhandenes Phosphortrichlorid verunreinigt. Die Analysen lieferten auf die Formel  $C_7H_4O_3PCl$  stimmende Zahlenwerte.

1. 0.3489g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.5255  $CO_2$  und 0.0637  $H_2O$ .

2. 0.2226g Substanz lieferten 0.3350  $CO_2$  und 0.0410  $H_2O$ .

3. 0.1518g Substanz lieferten 0.2302  $CO_2$  und 0.0300  $H_2O$ .

4. 0.1297 g Substanz lieferten 0.1966 CO<sub>2</sub> und 0.0250 H<sub>2</sub>O.

5. 0.2968 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf 270° erhitzt ergaben 0.2096 AgCl.

6. 0.2035 g Substanz ergaben 0.1442 AgCl.

7. 0.2013 g Substanz ergaben 0.1102 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

| Berechnet für                                    | Gefunden |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub> PCl | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| C 41.48                                          | 41.08    | 41.04 | 41.36 | 41.34 | —     | —     | —     |
| H 1.97                                           | 2.02     | 2.05  | 2.19  | 2.13  | —     | —     | —     |
| Cl 17.53                                         | —        | —     | —     | —     | 17.47 | 17.53 | —     |
| P 15.31                                          | —        | —     | —     | —     | —     | —     | 15.29 |
| O 23.70                                          | —        | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| <u>99.99</u>                                     |          |       |       |       |       |       |       |


In Uebereinstimmung mit den Resultaten der Analyse führt auch der quantitative Verlauf der glatten Reaction zu der Formel: C<sub>7</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>PCl.

Versuch: 24 g Salicylsäure

50 g Phosphortrichlorid.

|                                                  | Berechnet   | Gefunden    |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| HCl                                              | 12.6        | 13.5        |
| PCl <sub>3</sub> -Ueberschuss                    | 26.2        | 27.0        |
| C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub> PCl | 35.2        | 32.3        |
| Rückstand                                        | —           | 1.0         |
|                                                  | <u>74.0</u> | <u>73.8</u> |
| Verlust                                          | —           | 0.2         |

Aus diesen Zahlen ergibt es sich, dass auf ein Molecül Salicylsäure ein Molecül Phosphortrichlorid in Reaction getreten ist, und zwar unter Abspaltung von zwei Molecülen Salzsäure. Die Reaction von Phosphortrichlorid auf Salicylsäure lässt sich demnach durch folgende Gleichung ausdrücken:



Die Ausbeute an dem Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  betrug 91.8 pet. der berechneten. Die neue Verbindung wird vorläufig als Salicylophosphorigsäuremonochlorid bezeichnet, ohne damit eine Ansicht über ihre Constitution aussprechen zu wollen.

a) Salicylophosphorigsäuremonochlorid,  $C_7H_4O_3PCl$ . Manchmal bleibt der neue Körper im Zustande der Ueberschmelzung, besonders wenn er noch geringe Verunreinigungen enthält. Das reine Chlorid schmilzt bei  $36-37^\circ$ , siedet unter etwa 11 mm Druck constant bei  $127^\circ$ , ist leicht löslich in Chloroform und Benzol und riecht, wie viele Säurechloride, schwach nach Salzsäure, da es sich schon an feuchter Luft rasch zersetzt. Mit Wasser wird die Substanz unter starkem Zischen in Salicylsäure, Phosphorigsäure und Salzsäure zerlegt. Ein Versuch, das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  unter gewöhnlichem Druck zu destilliren, war erfolglos, da eine Zersetzung gegen  $245^\circ$  eintrat, indem der Körper unter Abgabe von Salzsäure allmählich verkohlte. Das Salicylophosphorigsäuremonochlorid addirt sehr leicht Chlor und Brom und setzt sich mit Phosphorpentachlorid um, unter Bildung von Phosphortrichlorid und einem Körper von der Zusammensetzung  $C_7H_4O_3PCl_3$ . Beim Erhitzen des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl$  mit Schwefelblumen habe ich keine Vereinigung der beiden Körper wahrnehmen können, sondern eine vollständige Zersetzung des Ersteren.

## 2. Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Salicylophosphorigsäuremonochlorid.

Bringt man das feste Chlorid und Phosphorpentachlorid in äquimolecularem Mengenverhältniss zusammen, so tritt, unter freiwilliger Erwärmung und ohne Entwicklung von Salzsäure, eine Verflüssigung der beiden festen Körper ein. Die Einwirkung ist so heftig, dass das Phos-

phorthrichlorid, welches eines der Reactionsproducte bildet, ins Sieden kommt. Man muss daher für gute Kühlung Sorge tragen. Nach beendeter Reaction wird die Reactionsmasse, welcher aus einer schwach gelb gefärbten Flüssigkeit besteht, im Vacuum rectificirt. Man erhält zwei Fractionen, einen bei  $78^{\circ}$  siedenden Teil, der aus reinem Phosphorthrichlorid besteht, und einen, welcher unter etwa 11 mm Druck constant bei  $168^{\circ}$  siedet (Temperatur des Paraffinbades  $190^{\circ}$ ). Die Analysen des bei  $168^{\circ}$  siedenden Teils haben nun gezeigt, dass der Substanz dieselbe Zusammensetzung zukommt, wie dem directen Einwirkungsproduct von Phosphorpentachlorid auf Salicylsäure. Das Chlorid  $\text{o-C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PCl}_3$ <sup>1)</sup> ist also nach der Gleichung entstanden:



1. 0.2261 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.2551  $\text{CO}_2$  und 0.0340  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.1649 g Substanz lieferten 0.1855  $\text{CO}_2$  und 0.0253  $\text{H}_2\text{O}$ .

3. 0.2354 g Substanz mit Wasser zerlegt ergaben 0.3688  $\text{AgCl}$ .

4. 0.2525 g Substanz ergaben 0.3959  $\text{AgCl}$ .

5. 0.2415 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^{\circ}$  erhitzt ergaben 0.0971  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

6. 0.2295 g Substanz ergaben 0.0922  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

Berechnet auf

Gefunden


| $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PCl}_3$ | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|----------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C                                            | 30.71        | 30.77 | 30.68 | —     | —     | —     |
| H                                            | 1.46         | 1.67  | 1.70  | —     | —     | —     |
| Cl                                           | 38.94        | —     | —     | 38.76 | 38.79 | —     |
| P                                            | 11.32        | —     | —     | —     | —     | 11.23 |
| O                                            | 17.55        | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                              | <u>99.99</u> |       |       |       |       |       |

1) Ann. Chem. und Pharm. (1887) **239**, 316.

Die auffallend glatte Spaltung des Phosphorpentachlorids in Phosphortrichlorid und Chlor durch das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$ , welches sich mit dem Chlor zu  $C_7H_4O_3PCl_3$  verband, weist darauf hin, dass beim Ersetzen zweier Chloratome des Phosphortrichlorids durch das Salicylsäureradical  $C_7H_4O_3$  die Anziehungsintensität des Phosphors gegen Chlor eine bedeutend grössere geworden ist; dass das Salicylophosphorigsäuremonochlorid eine weit grössere Neigung hat sich mit Chlor zu verbinden, wie das Phosphortrichlorid selber. Es folgte aus dem Verhalten des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl$  gegen Phosphorpentachlorid, dass vielleicht freies Chlor ebenso auf das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  zu wirken vermöge.

### 3. Einwirkung von Chlor resp. Brom auf das Salicylophosphorigsäuremonochlorid.

Leitet man auf die Oberfläche des geschmolzenen oder festen Chlorids einen mit Schwefelsäure getrockneten Chlorstrom, so wird, unter beträchtlicher Temperaturerhöhung und ohne irgend eine Gasentwicklung, das Chlor mit grosser Energie absorbiert. Die Reaction verläuft offenbar gemäss der Gleichung:



Es findet eine quantitative Absorption von Chlor statt, wie aus den beigefügten Zahlen hervorgeht.

Versuch. 19.0 g Chlorid absorbirten 6.7 g Chlor (berechnet 6.6 g).

Man setzt das Einleiten von Chlor so lange fort, bis das Product nicht mehr an Gewicht zunimmt. Hierauf wird es im Vacuum destillirt und man erhält, unter etwa 11 mm Druck, dasselbe constant bei  $168^\circ$  siedende Chlorid  $C_7H_4O_3PCl_3$ , welches durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$ , sowie von Phosphorpentachlorid auf Salicylsäure erhalten wurde.

0.3409 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^{\circ}$  erhitzt ergaben 0.5325 AgCl.

| Berechnet für    | Gefunden |
|------------------|----------|
| $C_7H_4O_3PCl_3$ |          |
| Cl 38.94         | 38.64.   |

Ein Vergleich des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl_3$  aus  $C_7H_4O_3PCl$  und Phosphorpentachlorid oder Chlor mit dem Chlorid  $C_7H_4O_3PCl_3$  aus Salicylsäure und Phosphorpentachlorid ergab sehr nahe Uebereinstimmung der Eigenschaften beider Substanzen.

|    | Ursprung.                                       | Sdep. unter 11 mm                            | Spec. Gew.                 |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| I  | $C_7H_4O_3PCl_3$ aus Salicylsäure und $PCl_5$   | $168^{\circ}$ ( $190^{\circ}$ Badtemperatur) | $d \frac{20}{4} = 1.55878$ |
| II | $C_7H_4O_3PCl_3$ aus $C_7H_4O_3PCl$ und $PCl_5$ | $168^{\circ}$ ( $190^{\circ}$ Badtemperatur) | $d \frac{20}{4} = 1.55868$ |

Auch gegen Wasser scheinen sich beide Chloride ganz gleich zu verhalten. Löst man die Chloride I und II in wasserfreiem Benzol und setzt auf ein Molecül Chlöräid je drei Molecüle Wasser zu dieser Lösung hinzu, so scheidet sich nach 24 Stunden die Säure  $C_7H_4O_3P(OH)_3$  in reinem Zustande ab. Wie Anschütz und Moore<sup>1)</sup> gezeigt haben, gelang es ihnen nicht, aus dem Chlorid I unter Anwendung von überschüssigem Wasser die Säure  $C_7H_4O_3P(OH)_3$  frei von Salicylsäure und Phosphorsäure zu gewinnen. Die aus dem Chlorid I auf die oben beschriebene Weise dargestellte Säure schmolz bei  $140^{\circ}$  und ergab bei der Analyse folgende Werte:

1. 0.1569 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.2200  $CO_2$  und 0.0477  $H_2O$ .

2. 0.1584 g Substanz lieferten 0.2231  $CO_2$  und 0.0487  $H_2O$ .

1) Ann. Chem. und Pharm. (1887) **239**, 317.

3. 0.1368g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf 270° erhitzt ergaben 0.0686  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für                            |       | Gefunden |       |       |
|------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|
| $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_6\text{P}$ |       | 1        | 2     | 3     |
| C                                        | 38.53 | 38.24    | 38.41 | —     |
| H                                        | 3.21  | 3.38     | 3.42  | —     |
| P                                        | 14.22 | —        | —     | 14.01 |
| O                                        | 44.04 | —        | —     | —     |
| <hr/>                                    |       |          |       |       |
| 100.00                                   |       |          |       |       |

Die aus dem Chlorid II dargestellte Säure schmolz bei 141—142° und ergab bei der Analyse folgende Werte:

0.1522g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.2133  $\text{CO}_2$  und 0.0484  $\text{H}_2\text{O}$ .

| Berechnet für                            |       | Gefunden |
|------------------------------------------|-------|----------|
| $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_6\text{P}$ |       |          |
| C                                        | 38.53 | 38.22    |
| H                                        | 3.21  | 3.53     |


Sowohl der Bildung der Säure  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{P}(\text{OH})_3$ , wie auch der physikalischen Eigenschaften der Chloride I und II zufolge, darf man mit voller Sicherheit annehmen, dass letztere Verbindungen identisch sind.

Wie Chlor so addirt sich auch Brom glatt an das Chlorid  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{P}\text{Cl}$ . Lässt man zu dem festen Chlorid mit Schwefelsäure getrocknetes Brom so lange tropfen, bis die entstehende Reactionsflüssigkeit, die sich anfangs sofort entfärbt, dauernd eine schwach rotgelbe Farbe annimmt, so wird, wie aus den beigefügten Zahlen hervorgeht, auf ein Molecül Chlorid genau ein Molecül Brom absorbiert.

Versuch I. 14.2g Chlorid absorbirten 10.8g Brom (berechnet 11.2g).

Versuch II. 15g Chlorid absorbirten 11.8g Brom (berechnet 11.9g).

Da kein Bromwasserstoff abgegeben wurde, so erfolgt die Reaction offenbar nach der Gleichung:



Bei dem Zusammentreffen von Brom mit dem Chlorid tritt starke Erwärmung und in Folge dessen Verflüssigung des Chlorids ein, und man muss daher während der Addition für gute Kühlung Sorge tragen. Nach Beendigung der Reaction wird die entstandene Flüssigkeit unter vermindertem Druck und Anwendung eines Graphitbades destillirt. Der Siedepunkt der neuen Verbindung, die eine schwere, farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit bildet, liegt unter etwa 12 mm Druck bei 185–188°. Die Elementaranalyse ergab folgende Zahlenwerte:

1. 0.2438 g Substanz mit Bleichromat verbrannt ergaben 0.2057 CO<sub>2</sub> und 0.0279 H<sub>2</sub>O.

2. 0.2454 g Substanz ergaben 0.2090 CO<sub>2</sub> und 0.0274 H<sub>2</sub>O.

3. 0.3026 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf 270° erhitzt lieferten 0.4316 Chlor- und Bromsilber. 0.1509 g dieses Gemenges ergaben im Chlorstrom erhitzt 0.1250 AgCl.

4. 0.2278 g Substanz ergaben 0.0702 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

| Berechnet für                                  |       | Gefunden |       |       |      |
|------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|------|
| $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PClBr}_2$ |       | 1        | 2     | 3     | 4    |
| C                                              | 23.17 | 23.01    | 23.22 | —     | —    |
| H                                              | 1.10  | 1.27     | 1.24  | —     | —    |
| Cl                                             | 9.79  | —        | —     | 9.68  | —    |
| Br                                             | 44.14 | —        | —     | 43.99 | —    |
| P                                              | 8.55  | —        | —     | —     | 8.60 |
| O                                              | 13.24 | —        | —     | —     | —    |
| <hr/>                                          |       |          |       |       |      |
| 99.99                                          |       |          |       |       |      |

Das specifische Gewicht des Chlorids  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PClBr}_2$  ergab den Wert:


$$d_{\frac{20}{4}} = 1.88522.$$

#### 4. Ueber die Constitution des Salicylophosphorigsäuremonochlorids sowie einiger seiner Derivate.


Was nun die Constitution der Verbindung  $C_7H_4O_3PCl$  betrifft, so können der Bildung, Umwandlung und Zersetzung desselben zufolge, nur zwei Formeln in Betracht kommen:





Nach Formel I ist die Verbindung ein Ortho-condensationsproduct, der zweiwertige Rest  $PCl$  verbindet den Carboxylsauerstoff der Salicylsäure mit dem Phenolsauerstoff, wodurch ein neuer aus sechs Atomen bestehender Ring gebildet wird.



Die Frage nach der Constitution des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl$  überträgt sich natürlich sowohl auf das Chlor- wie auch auf das Bromadditionsproduct. Ist die Formel:




für die aus Salicylsäure und Phosphortrichlorid erhaltene Substanz richtig, so könnten daraus durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid resp. Chlor sowie Brom zwei isomere Chloride resp. Bromide entstehen:



Die bis jetzt beobachteten Bildungsweisen des Körpers  $\text{o-C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PCl}_3$  resp.  $\text{o-C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PClBr}_2$ , sowie ihr Verhalten gegen Wasser lassen sich mit beiden Formeln verstehen und es ist nicht undenkbar, dass durch Einwirkung von Chlor resp. Brom auf das Chlorid  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PCl}$ , die Verbindungen a und a' zunächst entstehen, welche zwar bei gewöhnlicher Temperatur beständig sein dürften, aber beim Erwärmen oder bei der Destillation in die Verbindungen b und b' übergehen.

Falls das Chlorid  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_3\text{PCl}_3$  nach der Formel:



constituirt war, müsste es beim Behandeln mit Phenol ein Monophenyläther liefern. Hier war also eine Entscheidung durch das Experiment möglich. Das Chlorid wurde mit einem Ueberschuss von Phenol in einem Kölbchen am Rückflusskühler allmählich erwärmt. Bei etwa  $100^\circ$  wurde eine Salzsäureentwicklung bemerklich, welche bei  $150^\circ$  schliesslich aufhörte. Es hatten sich 3 g HCl entwickelt, während sich (auf ein Mol. HCl berechnet) nur 2.6 g HCl hätten entwickeln können. Die Reaktionsmasse, welche eine gelbgefärbte Flüssigkeit bildete, wurde nun im Vacuum rectificirt. Nachdem das überschüssige Phenol übergegangen war, erhielt ich, nach mehreren Rectificationen, unter etwa 13 mm Druck eine bei  $235^\circ$  leidlich constant siedende Fraction, welche bei der Analyse folgende Werte ergab:


1. 0.2718 g Substanz mit Bleichromat verbrannt lieferten 0.4718  $\text{CO}_2$  und 0.0727  $\text{H}_2\text{O}$ .

2. 0.2536 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt lieferten 0.2187 AgCl und 0.0855  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .


3. 0.2830 g Substanz lieferten 0.2482 AgCl und 0.0937  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ .

| Berechnet für       |       | Gefunden |       |       |
|---------------------|-------|----------|-------|-------|
| $C_{13}H_9O_4PCl_2$ |       | 1        | 2     | 3     |
| C                   | 47.13 | 47.33    | —     | —     |
| H                   | 2.72  | 2.97     | —     | —     |
| Cl                  | 21.45 | —        | 21.33 | 21.73 |
| P                   | 9.36  | —        | 9.42  | 9.25  |
| O                   | 19.33 | —        | —     | —     |
| <hr/>               |       |          |       |       |
| 99.99               |       |          |       |       |

Aus diesen Zahlen ergibt es sich, dass auf ein Molecül  $C_7H_4O_3PCl_3$  nur ein Molecül Phenol in Reaction getreten ist, und zwar unter Abspaltung von einem Molecül Salzsäure. Demnach liess die Reaction sich durch folgende Gleichung ausdrücken:




Der neue Aether, welchen ich immer in schlechter Ausbeute erhalten habe, stellt eine schwere Flüssigkeit dar und wird durch Kochen mit Wasser in Salzsäure, Phosphorsäure, Phenol und Salicylsäure zerlegt. Falls der Körper  $C_{13}H_9O_4PCl_2$  als  $POCl_2$ -Verbindung des Salols:




anzusehen war, hätte man erwarten sollen, dass bei der Behandlung mit Methylalkohol Salol entstände oder dessen Methyläther, da Salol sich aus Methylalkohol unverändert umkrystallisiren lässt. Mit wasserfreiem Methylalkohol erwärmt, lieferte die Verbindung  $C_{13}H_9O_4PCl_2$  jedoch Salzsäure, Phosphorsäure, Phenol, Salicylsäure und Salicylmethyläther.

Nun war es allerdings denkbar, dass der  $POCl_2$ -Rest möglicher Weise die Eigenschaften der  $C_6H_5CO_2$ -Gruppe modificirt und sie durch Methylalkohol leichter angreifbar macht, als dies bei Salol selbst der Fall ist. Ich beschloss daher einen anderen Weg einzuschlagen um zu einer Ent-

scheidung zu gelangen, indem ich vom Salol ausgehend die Verbindung:



darzustellen versuchte und zwar durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Salol, etwa nach der Gleichung:




Zu dem Zwecke wurden Phosphoroxychlorid und Salol in äquimolecularem Mengenverhältniss vermischt. Auffallender Weise reagirten die Substanzen gar nicht aufeinander, selbst als sie im Kölbchen am Rückflusskühler bis auf  $175^\circ$  erhitzt wurden. Hierauf wurden beide Substanzen im zugeschmolzenen Rohr im Schiesskasten bis auf  $170\text{--}180^\circ$  eine Stunde erhitzt. Erst bei dieser Temperatur erfolgt die Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Salol. Nach dem Erkalten des Rohrs machte sich beim Aufschmelzen ein beträchtlicher Druck bemerklich, indem viel Salzsäure entwich. Dies Erhitzen, Erkalten und Aufschmelzen des Rohrs wurde nun so lange fortgesetzt, bis keine Salzsäure mehr abgegeben wurde. Beim Rectificiren des Röhreninhalts, welcher eine rothe Flüssigkeit bildete, habe ich keine einheitliche Substanz isoliren können. Mehrere Fractionen, die erhalten wurden, bewiesen, dass die Reaction nicht so einfach vor sich gegangen war, wie die oben angegebene Gleichung andeutet. Eine relativ sehr kleine Fraction, die zwar keineswegs constant siedete, zeigte einen Siedepunkt nahe dem der Verbindung  $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_4\text{PCl}_2$ . Eine Chlorbestimmung dieser Substanz ergab Folgendes:


0.2424 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^\circ$  erhitzt lieferten 0.1948 AgCl.

| Berechnet auf                                   | Gefunden |
|-------------------------------------------------|----------|
| $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_4\text{PCl}_2$ |          |
| Cl 21.45                                        | 19.88.   |

Auf eine vollständige Analyse musste ich jedoch Verzicht leisten, denn die Substanz war in zu geringer Menge entstanden. Da nur ein glatter Verlauf der Reaction einen Rückblick auf die Constitution  $C_{13}H_9O_4PCl_2$  erlaubt hätte, so habe ich mich nach den geschilderten Misserfolgen nicht mit der genannten Substanz beschäftigt. Wenn auch vieles für die zuerst von Anschütz<sup>1)</sup> dem Chlorid  $C_7H_4O_3PCl_3$  zugeschriebene Constitutionsformel:



die auch ich für die wahrscheinlichere zu halten geneigt bin, spricht, so habe ich doch keine Reactionen auffinden können, welche die Formel:



ausschliessen.

Um zu einer näheren Kenntniss der Constitution des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl$  zu gelangen, habe ich zwei Wege eingeschlagen, nämlich das Verhalten desselben gegen Zinkäthyl und Natriummethylat, deren Besprechung zunächst mitgeteilt werden soll.

Die Zinkalkyle sind bekanntlich sehr reactionsfähig und setzen sich sowohl mit den Chloriden der Metalloide wie Schwermetalle leicht um, unter Bildung von Chlorzink und alkylirten Metallen und Metalloiden. So entsteht, wie Hofmann<sup>2)</sup> gezeigt hat, durch Einwirkung von Zinkäthyl auf Phosphortrichlorid, das Triäthylphosphin  $P(C_2H_5)_3$ .

Es fragte sich nun, ob man nach Vertretung zweier Chloratome des Phosphortrichlorids durch das Radical  $C_7H_4O_3$  das übrige Chloratom durch eine Aethylgruppe ersetzen könnte, und zwar durch Einwirkung von Zinkäthyl auf das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$ . Auf diese Weise bekäme man

1) Ann. Chem. und Pharm. (1885), **228**, 308.

2) Ann. Chem. und Pharm. (1857), **104**, 7.

vielleicht eine Verbindung von der Zusammensetzung  $C_7H_4O_3PC_2H_5$ , welche, beim Behandeln mit Wasser oder Alkalien, Aethylphosphinsäure  $C_2H_5PO(OH)_2$  liefern sollte. Verliefe die Reaction im angedeuteten Sinne, so wäre es bewiesen, dass das Chlor in dem Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  mit Phosphor verbunden ist.

Die zu dem Versuch nötige Menge Zinkäthyl stellte ich nach dem Verfahren von Beilstein und Alexejew<sup>1)</sup> dar. Nach Hofmann ist die Reaction zwischen Zinkäthyl und Phosphortrichlorid eine äusserst heftige und wird bisweilen sogar von Explosionen begleitet. Um solche Unannehmlichkeiten möglichst zu vermeiden, wurde der Versuch im Kohlensäurestrom in folgender Art ausgeführt. Eine ätherische Lösung des Chlorids  $C_7H_4O_3PCl$  wurde mittelst eines kleinen Tropfapparats langsam zu dem mit Aether verdünnten Zinkäthyl eintropfen lassen. Beim Zusammentreffen des Chlorids mit dem Zinkäthyl war die Einwirkung kaum wahrzunehmen. Nur einmal geriet der Aether ins Sieden. Etwa ein Molecül des Chlorids wurde zu einem Molecül des Zinkäthyls hinzugefügt. Nach beendeter Reaction bestand die Reactionsmasse aus zwei Schichten, eine schwere, hellgelb gefärbte dicke Flüssigkeit, auf welcher eine durchsichtige, kaum gefärbte, bewegliche Flüssigkeit schwamm. Erstere wurde allmählich fest und alsdann die obere Schicht abgegossen, um nach Verdunsten des Aethers im Vacuum rectificirt zu werden. Nachdem der Aether verdunstet war, trat eine heftige Reaction im Destillirkölbchen ein, indem der Inhalt desselben überschäumte und zwar unter einer plötzlichen Temperaturerhöhung von etwa  $120^\circ$ . Die Masse war ganz dunkel geworden und roch stark nach Phosphin. Der feste Teil des Reactionsproducts von Zinkäthyl auf das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  wurde zunächst aus dem Gefäss herausgenommen und an

---

1) Bulletin de la Société chimique de Paris **2**, 51.

der Luft liegen gelassen. Die Substanz zerfiel allmählich in ein gelbgefärbtes, krystallinisches Pulver, welches in Aether, Benzol, Alkohol, Ligroin und Schwefelkohlenstoff vollständig unlöslich war. In Alkalien löste es sich zu einer rötlichgelb gefärbten Flüssigkeit, die einen äusserst widerlichen Geruch der Phosphine besass. Beim Ansäuern dieser alkalischen Lösung wurde kein Niederschlag erzeugt, wohl aber verschwand der Phosphingeruch. Demnach wurde die Substanz beim Auflösen in Alkalien verändert. Eine vorläufige Chlorbestimmung des durch Aether und Benzol ausgewaschenen, gelben Pulvers ergab Werte, die auf eine Verbindung von einem Molecül des  $C_7H_4O_3PCl$  mit zwei Molecülen Zinkäthyl am besten stimmten.

1. 0.1776 g Substanz mit rauchender Salpetersäure auf  $270^0$  erhitzt lieferten 0.0530 AgCl.

2. 0.1777 g Substanz lieferten 0.0540 AgCl.

| Berechnet auf                  | Gefunden |       |
|--------------------------------|----------|-------|
| $C_7H_4O_3PCl + 2Zn(C_2H_5)_2$ | 1        | 2     |
| Cl 7.91                        | 7.38     | 7.51. |

Das gelbe Pulver, mit festem Kali und wenig Wasser behandelt, lieferte ein rotgefärbtes, stark nach Phosphin riechendes Oel, welches jedoch nur in sehr kleinen Mengen entstand. Ein Versuch das Oel zu destilliren misslang. Wegen dieses ungünstigen Resultats sah ich von einer weiteren Bearbeitung dieser Reaction ab und wandte mich zu dem Verhalten des Natriummethylats gegen das Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$ .


War es mir möglich, in der Verbindung  $C_7H_4O_3PCl$  das Chloratom durch die Methoxylgruppe  $CH_3O$  zu ersetzen, so hoffte ich, bei richtig gewählten Versuchsbedingungen zu der Methylphosphorigsäure  $CH_3OP(OH)_2$  zu gelangen. Das Natriummethylat wurde durch Eintragen von Natriumdraht in absoluten Methylalkohol und Erhitzen des entstandenen Products im Wasserstoffstrom bis auf  $180^0$  bereitet. Eine ätherische Lösung des Chlorids

$C_7H_4O_3PCl$  (1 Mol.) wurde zu dem Methylat (1 Mol.) langsam eintropfen lassen. Die Reaction war eine sehr heftige, so dass das Reactionsgefäß abgekühlt werden musste. Jedoch geriet der Aether ins Sieden und dabei machte sich bald ein unausstehlicher Geruch der Phosphine bemerklich. Nachdem alles Chlorid hinzugefügt war, hatte sich eine beträchtliche Menge  $NaCl$  abgeschieden. Vom letzteren wurde die ätherische Lösung abfiltrirt, der Aether im Vacuum verjagt und das hinterbliebene Product zu destilliren versucht. Unter etwa 12mm Druck gingen bei  $95-100^0$  wenige Tropfen eines farblosen Oels über, welches sich als Salicylsäuremethylläther erwies. Der nicht weiter ohne Zersetzung destillirbare Rückstand wurde mit Wasser versetzt, die wässerige Lösung von der abgeschiedenen Salicylsäure filtrirt, mit Soda neutralisirt und mit Aether ausgezogen. Ein Versuch, das etwaige Vorhandensein von Methylphosphorigsäure nachzuweisen, ergab keine Spur derselben. Die Einwirkung von Natriummethylat auf das Salicylphosphorigsäuremonoehlorid war demnach nicht einfach verlaufen, jedoch spricht die Entstehung von flüchtigen nach Phosphin riechenden Verbindungen, sowohl in dieser wie auch in der vorhergehenden Reaction, dafür, dass das Chlor in dem Chlorid  $C_7H_4O_3PCl$  mit dem Phosphor in Verbindung stehe.

## 5. Schlussbetrachtungen.

Zum Schlusse möge es mir gestattet sein, die erhaltenen Resultate vorliegender Arbeit kurz zusammenzufassen.

Im ersten Teil habe ich mich damit beschäftigt, Phenoxylderivate des Phosphorpentachlorids darzustellen und zwar ist dies Ziel auf indirectem Wege erreicht worden. Ich habe gezeigt, dass man bei der Behandlung der Phenyllderivate des Phosphortrichlorids mit Chlor zu den Verbindungen:



gelangen kann. Ein besonderes theoretisches Interesse beansprucht die Gewinnung des Tetrachlorids  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OPCl}_4$ , denn letztere Verbindung stellt sehr wahrscheinlich das erste Product der directen Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Phenol dar. Solche Phenoxylderivate des Phosphorpentachlorids, welche eine eigene Körperklasse bilden, waren vor meiner Arbeit ganz unbekannt.

Ferner ist das Verhalten der Phenoxylabkömmlinge des Phosphortrichlorids gegen Brom sowie gegen Schwefel studirt worden, mit dem Ergebniss, dass Brom leicht, Schwefel dagegen nur beim Erhitzen addirt wird.

Vor Kurzem war zum ersten Male die Reactionsweise von Phosphorpentachlorid auf eine beschriebene aromatische Oxycarbonsäure bis zu einem gewissen Grade klargelegt worden, nämlich auf Salicylsäure.<sup>1)</sup> Um auch hierbei die Reaction in zwei Teile zu zerlegen, liess ich zunächst Phosphortrichlorid auf Salicylsäure einwirken und auf das so gewonnene Product Chlor. Diese Reactionen bilden den Hauptinhalt des zweiten Theils meiner Arbeit.

Bei der Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Salicylsäure entsteht eine neue und recht interessante Verbindung, allem Anscheine nach ein Orthocondensationsproduct. Dieses addirt, analog den Phenoxyderivaten des Phosphortrichlorids, sehr leicht Chlor sowie Brom und geht dabei in der That in das erste Product der directen Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Salicylsäure über.

Ferner sind mehrere Versuche angestellt worden zur Feststellung der Constitution der Salicylsäureabkömmlinge des Phosphortrichlorids sowie des Phosphorpentachlorids, allein wegen der grossen Schwierigkeiten, welche sich ent-

---

1) Ann. Chem. und Pharm. (1885) **239**, 316.

gegengestellt haben, bin ich zu einem wirklich positiven Beweis leider nicht gekommen.

Vorliegende Arbeit wurde auf der Kgl. Rhein. Friedr.-Wilh.-Universität zu Bonn im Wintersemester 1886/87 begonnen und im Sommersemester 1887 beendet.

An dieser Stelle erlaube ich mir Herrn Prof. Dr. R. Anschütz, auf dessen Veranlassung die Arbeit unternommen wurde, für mannigfache Anregung und Förderung meiner Studien den herzlichsten Dank auszusprechen.

---